The background of the slide features two axial MRI brain scans. The scan on the left shows a hyperintense area in the left hemisphere, while the scan on the right shows a more complex lesion with a central dark spot and surrounding hyperintensity. The text is overlaid on these images.

Schlaganfall

Allgemein und
Speziell bei Frauen

14.05.2025, Dr. med. Carolin Adldinger

Schlaganfall – Allgemein und Speziell bei Frauen

I. Schlaganfall allgemein

1. Zahlen zum Schlaganfall
2. Formen des Schlaganfalls
3. Symptome des Schlaganfalls
4. Risikofaktoren
5. Behandlung
6. Schlaganfallprophylaxe

II. Schlaganfall speziell bei Frauen

1. Besondere Risikokonstellationen
2. Besondere Symptome

Wie viele Menschen erleiden in Deutschland einen Schlaganfall?

**550 Menschen
täglich und
250.000 bis 300.000
jährlich in Deutschland**

**500.000 Menschen müssen mit
ihrem Schlaganfall leben**

Ökonomische Belastung des Gesundheitssystems

➔ Kosten pro Schlaganfallpatient im 1. Jahr: 18.517 Euro

**Gesamtkosten für
Schlaganfall
in Deutschland/Jahr:
17 Milliarden Euro**

Wie viele Menschen bleiben lebenslang behindert durch den Schlaganfall?

Der Schlaganfall ist die häufigste Ursache von Behinderungen im Erwachsenenalter

Formen des Schlaganfalls

In ca. 15% eine
Blutung im Gehirn

In ca. 85% eine begrenzte
Durchblutungsminde-
rung

Darstellung einer Durchblutungsminderung

**Fehlende Blutversorgung
(Infarkt)**

**Thrombus
(Gefäßverschluss)**

Darstellung einer Hirnblutung

Formen des Schlaganfalls

Durchblutungsminderung

Blutung

Welche Aufgaben hat unser Gehirn?

Das Gehirn ist die „Schaltzentrale“ des Organismus

Symptome des Schlaganfalls („Minussymptome“)

Ein Schlaganfall „wächst“

Warum ist beim Schlaganfall die Zeit kostbar?

Zeit ist Hirn: In Zahlen

	Zugrunde gegangene Neuronen	Zugrunde gegangene Synapsen	Zugrunde gegangene Myelinfasern	beschleunigte Alterung
pro Schlaganfall	1,2 Milliarden	8,3 Billionen	7.140 km	36 Jahre
pro Stunde	120 Millionen	830 Milliarden	714 km	3,6 Jahre
pro Minute	1,9 Millionen	14 Milliarden	12 km	3,1 Wochen
pro Sekunde	32.000	230 Millionen	200 m	8,7 Stunden

Beim Schlaganfall geht in kürzester Zeit eine große Menge an Nervengewebe im Gehirn verloren.

Therapie des akuten Schlaganfalls

Therapie des akuten Schlaganfalls

Therapie bei Großgefäßverschlüssen: Thrombektomie

Verschluss
der mittleren
Hirnschlag-
ader

Therapie bei Großgefäßverschlüssen: Thrombektomie

Welches sind die typischen Ursachen des Schlaganfalls?

Häufige Risikofaktoren eines Schlaganfalls

Welche Risikofaktoren für einen Schlaganfall können Sie selbst beeinflussen?

Weitere Risikofaktoren:
Erhöhte Blutfettwerte, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol, Drogen, Pille

Medikamentöse Schlaganfallprophylaxe

- **Medikamentöse „Standardtherapie“:**
ASS 100 mg 1-0-0 in Kombination mit Cholesterinsenker (Statin)
- Bei Nachweis von **Vorhofflimmern**:
Stärkere Blutverdünnung mit einer Antikoagulation
(Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran, Marcumar)

Was passiert im Herzen bei Vorhofflimmern?

Normaler Herzrhythmus

Vorhofflimmern

Und natürlich noch: Behandlung der Risikofaktoren

- **Blutdruckeinstellung** bei erhöhtem Blutdruck
- **Diabeteseinstellung** bei Diabetes mellitus
- **Cholesterinsenkung** bei erhöhten Cholesterinwerten
- **Lebensstil:**
 - kein Rauchen
 - normales Gewicht
 - tägliche körperliche Aktivität ≥ 30 Minuten
 - mediterrane Kost
 - moderater Alkoholkonsum

Führt „die Psyche“ auch zu Schlaganfällen?

- Shimbo et al 2024: **Ärger** (und nicht Angst oder Depressivität) führt in besonderer Weise zur Störung der Gefäßwände, dies erhöht nachweislich das Risiko für Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle
- INTERSTROKE-Studie 2021: **Ärger** und **emotionale Aufregung** könnten akute Auslöser für Schlaganfälle (insbesondere Hirnblutungen) sein

Was ist bei Frauen nun anders?

- **Frauen erleiden häufiger einen Schlaganfall als Männer**
 - Frauen leben länger als Männer
 - 18-40Jahre und > 80 Jahre: weibliche Schlaganfälle häufiger (40-79 Jahre: Männer häufiger)
- **Frauen haben häufiger Vorhofflimmern als Männer**
 - Risiko von Vorhofflimmern steigt mit dem Alter
 - Schlaganfälle unter Vorhofflimmern sind schwerer
- **Frauen haben schwerere Folgen des Schlaganfalls**
 - **höheres Alter** und **vorbestehende Einschränkungen** beim ersten Schlaganfall
 - Risikofaktoren bei Frauen (u.a. Bluthochdruck, Diabetes) wirken sich relevanter aus
 - **weniger soziale Unterstützung** (häufig alleinlebend)
 - Frauen sterben häufiger an den Folgen: 2.häufigste Todesursache bei Frauen
 - Frauen haben häufiger eine Depression nach dem Schlaganfall
 - Frauen haben nach Schlaganfall eine schlechtere Lebensqualität

Was ist bei Frauen nun anders?

- **Frauen erleiden häufiger einen Schlaganfall als Männer**
 - Frauen leben länger als Männer
 - 18- 40 Jahre und > 80 Jahre: weibliche Schlaganfälle häufiger (40-79 Jahre: Männer häufiger)
- **(Ältere) Frauen haben eine schlechtere Prognose nach dem Schlaganfall**
- **Frauen haben schwerere Folgen des Schlaganfalls**
 - **höheres Alter** und **vorbestehende Einschränkungen** beim ersten Schlaganfall
 - Risikofaktoren bei Frauen (u.a. Bluthochdruck, Diabetes) wirken sich relevanter aus
 - weniger soziale Unterstützung (häufig alleinlebend)
 - Frauen sterben häufiger an den Folgen: 2.häufigste Todesursache bei Frauen
 - Frauen haben häufiger eine Depression nach dem Schlaganfall
 - Frauen haben nach Schlaganfall eine schlechtere Lebensqualität

Sind die Symptome bei Frauen anders?

- **Symptome sind ähnlich wie bei Männern**
- **Frauen erhalten bei leichten Schlaganfällen seltener die Diagnose Schlaganfall und werden später behandelt**
 - teils zusätzliche Symptome, wie: Ohnmacht, Kurzatmigkeit, Glieder-/Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit
 - seltener optimale Abklärung/Behandlung, damit erhöhtes Schlaganfallrisiko

Und die jüngeren Frauen?

- **18-44 Jahre: mehr weibliche Schlaganfälle als männliche**
- **Besondere Risiko durch hormonelle Kontrazeption (3x)**
 - insbesondere bei Raucherinnen und bei Frauen mit Migräne
- **Erhöhtes Risiko durch Migräne (mit Aura)**
 - Frauen haben häufiger eine Migräne
- **Schwangerschaft (insbesondere peripartal)**

Welche Rolle spielen die Hormone?

- **Bluthochdruck in Schwangerschaft (insbesondere Präeklampsie):** dauerhaft erhöhtes Schlaganfallrisiko
- **Frühgeburt(en):** 40% erhöhtes Schlaganfallrisiko (auch erhöhtes Risiko für Bluthochdruck/Diabetes/Hypercholesterinämie)
- **Orale Kontrazeptiva, Hormontherapie in Wechseljahren**
- **Späte Menopause (>55 Jahre):** erhöhtes Risiko für Hirnblutung (2,4fach) und erniedrigtes Risiko für ischämischen Schlaganfall (um ein Drittel niedriger)
- **Entfernung der Eierstöcke** (Entfernung der Gebärmutter senkt Risiko)

Fazit:

- **(auch) bei Frauen mehr Fokus auf (Primär)Prävention**
- **öfters mal ein EKG bei Frauen**
- **Auffangende Netzwerke auf Gemeindeebene / kommunaler Ebene insbesondere für Frauen wichtig**

Frauengesundheit – Ein Leben lang

Jahresschwerpunkt des Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention 2024 und 2025

GESUNDHEITSBERICHTERSTATTUNG DES BUNDES
GEMEINSAM GETRAGEN VON RKI UND DESTATIS

Gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland – wichtige Fakten auf einen Blick

Phoenix Freising

Verein zur Förderung von
Menschen mit Hirnschäden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!